

Consentimiento Informado Coronas, Puentes, Veneer, Inlays, y Onlays

Las coronas dentales son restauraciones que cubren o rodean al diente, restaurándolos a su tamaño natural, forma y color. Una corona no solo ayuda en la apariencia sino también fortalece al diente. Un puente fijo sirve para reemplazar dientes que se han perdido. Los dientes ausentes pueden ser reemplazados por apariencia o para prevenir problemas de mordida o encías relacionados con la migración o sobrecargar de los dientes. Algunas veces no es necesario que la corona cubra todo el diente, en estos casos se puede hacer una inlay, onlay o veneer. Una inlay restaura la parte masticatoria del diente sin cubrir las cúspides; un onlay restaura la parte masticatoria incluyendo las cúspides; un veneer cubre la parte frontal de un diente. Las coronas o puentes están hechos de porcelana, resinas, o acrílicos y pueden tener o no, una base interna de metal. También pueden ser solos de metal. Los inlays y onlays pueden ser de porcelana, resinas, acrílicos o metal; las veneers solo pueden ser sin metal. Como en todos los procedimientos, hay ciertos posibles problemas que pueden ocurrir con estas restauraciones. Estos incluyen pero no están limitados a lo siguiente:

- Sensibilidad dental lo cliente, frío o al aire.
- A posible necesidad de un tratamiento de nervio (root canal therapy). El acumulativo efecto de la caries, rellenos y fracturas en el diente puede ser evidente durante la preparación de la corona o después de hacer la corona.
- Enfermedad Periodontal (encías) puede ocurrir a cualquier edad, con o sin estas restauraciones. Hablando en general las coronas, puentes, veneers, inlays y onlays no causan ni previenen la enfermedad periodontal.
- Fracturas de los materiales pueden ocurrir después de ponerlas. Las fracturas pequeñas pueden ser reparadas, las fracturas grandes pueden requerir una corona, puente, veneer, inlay, o onlay nuevo.
- Líneas negras en el borde de la encía pueden aparecer en coronas o puentes con base de metal. Esto es el filo de metal de la corona. Si la encía se aleja después de cementarla, este metal va a ser visible. Algunas veces esto puede ser corregido, otras veces será necesario una nueva corona o puente.
- Caries recurrente puede ocurrir después de la colocación. Esto se puede corregir con un relleno o puede ser necesario una nueva corona o puente.
- Impacto de comida puede ocurrir debajo del puente o alrededor de las restauraciones. Esto puede ser una condición irreparable. Será necesario un meticuloso cuidado por parte del paciente.
- Disfunción de la articulación mandibular puede ocurrir debido a los cambios en la mordida después de colocar las coronas, puentes, veneers, inlays y onlays. Esto se puede corregir usualmente pero en raras ocasiones pueden causar síntomas requiriendo un tratamiento extenso.

Yo entiendo el tratamiento recomendado, los costos involucrados, los riesgos de dicho tratamiento, cualquier alternativa y riesgos de esas alternativas, incluyendo las consecuencias de no hacer nada. Todas mis preguntas fueron respondidas y no se me ha ofrecido garantía alguna.

Firma del Paciente: _____

Fecha: _____

Testigo: _____